



# Recevoir un traitement précoce contre l'Ebola



Restez à une distance  
d'au moins 3 pieds  
(1 mètre) du patient.





Si une personne proche est malade et que vous soupçonnez qu'il s'agit d'une infection au virus Ebola, demandez du secours. Ne le touchez pas et ne touchez pas son sang ou ses fluides corporels (vomissements, selles, urine, sueur). Dites-lui de boire beaucoup de Solution de réhydratation orale (SRO) ou d'eau. Les patients qui boivent beaucoup de SRO dès les premiers symptômes ont de bien meilleures chances de survivre. Ne touchez pas la tasse dans laquelle boit le patient. Remplissez-la de nouveau sans la toucher. Lavez-vous souvent les mains pendant que vous attendez de l'aide.






Si vous avez un proche malade, une ambulance est la façon la plus sûre de l'emmener à un établissement de soins. Ne prenez pas de taxi ou de transport public. Si votre proche est transporté vers un établissement de soins rapidement, il ou elle aura de bien meilleures chances de survivre à l'Ebola. Cela contribue également à protéger votre famille.





Votre proche recevra les meilleurs soins médicaux précoces dans l'établissement de soins. Il ou elle boira beaucoup de SRO et prendra des médicaments contre la fièvre et les autres symptômes. Dans un centre de soins, le personnel de soins de santé portant des vêtements de protection peut s'occuper des patients en toute sécurité, bien mieux qu'à la maison.





Votre proche aura de bien meilleures chances de survivre à l'Ebola s'il ou elle reçoit des soins médicaux précoces, peu de temps après l'apparition des symptômes.