


DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO

ENTRE ADULTOS EN ÁREAS RURALES

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), del 2019 al 2020, correspondientes a adultos en áreas rurales en 41 estados: personas de 45 años o más

1 de cada 10

personas de 45 años o más tiene **Deterioro Cognitivo Subjetivo**



El **DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO** consiste en **PROBLEMAS DE LA MEMORIA** autorreportados que han **EMPEORADO** a lo largo del último año

El 41% de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias



El 87 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica

Una de cada tres

personas con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas de voluntariado



Menos de la mitad de las personas con deterioro cognitivo subjetivo han conversado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica

El 38 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda con las tareas del hogar



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

alzheimer's association

cdc.gov/aging

alz.org/publichealth