

¿Cómo puedo pagar por la PEP?

¿ Puedo tomar los medicamentos de la PEP cada vez que tenga relaciones sexuales sin usar condón?


No. Solo debe usar la PEP en situaciones de emergencia.

• Se receta la PEP después de una posible exposición al VIH.

• La PEP no sustituye el uso regular de otros métodos para prevenir la infección por el VIH.

• La PEP no es la opción adecuada para las personas que podrían estar expuestas al VIH con frecuencia.

• Si usted tiene comportamientos que podrían aumentar sus probabilidades de contraer el VIH, hable con su proveedor de atención médica sobre la PrEP (profilaxis preexposición).



3

Según la razón por la cual le receten la PEP, podría reunir los requisitos para recibir estos medicamentos gratis o a bajo costo.

• Si ha sido víctima de una agresión sexual, podría reunir los requisitos para que le reembolsen parcial o totalmente el costo de los medicamentos y la atención médica. Encuentre los recursos que hay en su área: www.justice.gov/ovw/local-resources

• Si cree que estuvo expuesto al VIH en el trabajo, el seguro médico de su trabajo o el seguro de compensación al trabajador generalmente pagará por la PEP.

Si usted no puede obtener cobertura con un seguro médico, su proveedor de atención médica puede presentar una solicitud para que reciba la PEP de manera gratuita por medio de uno de los programas de asistencia con los medicamentos que ofrecen los fabricantes.




4

Si usted no tiene el VIH o no sabe si lo tiene, y en las últimas 72 horas:

- estuvo posiblemente expuesto al VIH a través de una relación sexual (por ejemplo, si se rompió el condón),
- ha sido víctima de una agresión sexual, o
- ha compartido agujas, jeringas u otro implemento para la inyección de drogas,

hable inmediatamente con su proveedor de atención médica, un médico de la sala de emergencias o un proveedor de atención médica de urgencia acerca de la PEP.



2

¿Qué es la PEP?

PEP, o profilaxis posexposición, significa tomar medicamentos para prevenir la infección por el VIH después de una posible exposición.

La PEP se debe comenzar dentro de las 72 horas (3 días) después de la posible exposición al VIH. Cuanto antes comience la PEP, mejor. ¡Cada hora cuenta!



- Si su proveedor de atención médica le receta la PEP, deberá tomar estos medicamentos a diario por 28 días.
- La PEP es eficaz para la prevención del VIH, pero no en un 100 %. Siempre use condones con sus parejas sexuales y practique hábitos de inyección seguros.

1



Ending the HIV Epidemic

Para obtener más información sobre la PEP, consulte www.cdc.gov/hiv/spanish y para obtener información general sobre el VIH, llame al **1-800-CDC-INFO (232-4636)**.



¡Escanea para obtener más información!

PEP


Si usted puede haber estado expuesto al VIH en las últimas 72 horas (3 días), hable de inmediato con un proveedor de atención médica sobre la PEP.



Cómo doblar y agregar la información de su organización en la guía de bolsillo


Primero imprima la ilustración del folleto (ambos lados).

1




El **panel 3** de la ilustración debe quedar de frente a quien lo ve.

2




Doble el papel por la mitad (de manera horizontal), y el **panel 2** deberá quedar ahora legible y hacia arriba.

3



Doble el papel por la mitad (de manera vertical), las **cubiertas del frente y de atrás** deberán quedar ahora visibles y legibles.

4



Doble el papel por la mitad (de manera vertical); solo la **cubierta del frente** deberá quedar ahora visible y legible.

Cómo agregar la información de su organización:

En la cubierta de atrás de la guía de bolsillo hay una casilla en PDF que se puede llenar, que dice “**Información local aquí**”. En Adobe Acrobat, usted puede editar esta casilla para agregar la información de contacto local o los recursos. Si no desea agregar la información de su organización, remueva el texto “**Información local aquí**” para que no aparezca cuando se imprima.