


POLIO SPREADS EASILY

پوليو به آسانی انتشار پیدا می کند
پوليو په آسانی سره خپرېږي



Sore throat | گلو درد | ږوخ ښووتس د



Fever | تب | تبه



Stomach pain | دلدرد | د معدي درد



Arm weakness | د مت کمزورتيا | ضعيفی بازوها



Leg weakness | د لينگی کمزورتيا | ضعيفی پایها

If You Have Polio Symptoms Immediately Report Your Symptoms to Medical Staff

اگر اعراض و علائم پوليو را در خود می بينيد
فوراً اعراض و علائم خود را به کارکنان صحی راپور بدهيد

که تاسو د پوليو نښې لرئ
سمدستي خپلې نښې طبي کارمندانو ته راپور کړئ

Polio can cause:

- weakness in arms or legs (paralysis)
- trouble breathing or swallowing

Polio can begin with:

- Sore throat
- Fever
- Tiredness
- Nausea
- Headache
- Stomach pain

These symptoms usually last
2 to 5 days.

پوليو ميتواند باعث مشکلات ذيل شود:

- ضعيفی بازوها يا پایها (فلج)
- مشکل تنفسی يا بلعیدن

پوليو ميتواند با اعراض و علائم ذيل شروع
شود:

- گلو درد
- تب
- ماندگی
- دلبدی
- سردرد
- دلدرد

اين علائم معمولاً به مدت 2 الی 5 روز دوام
پیدا می کنند.

پوليو کولای شي لامل شي:.

- د متونو او لينگو کمزورتيا (فلج)
- په ساه اخیستلو يا تيرولو کې ستونزه

پوليو له دې سره پيل کېدای شي:.

- د ستونی خوږ
- تبه
- ستړيا
- زړه بدېدنه
- د سر درد
- د معدي درد

دا نښې معمولاً له 2 څخه تر 5 ورځو پورې
دوام کوي.

Vaccines are available. Get the polio vaccine when it is offered by medical staff.

واکسين موجود است. اگر واکسين پوليو توسط پرسونل صحی پیشنهاد می شود، آن را دریافت کنید.
واکسينونه موجود دي. د پوليو واکسين ترلاسه کړئ کله چې د طبي کارکوونکو لخوا وړاندیز کېږي.