EL SARAMPIÓN

NO ES SIMPLEMENTE UN SARPULLIDO LEVE

El sarampión puede ser peligroso, especialmente para los bebés y los niños pequeños.

Los síntomas del sarampión incluyen los siguientes:

- **Fiebre alta** (puede subir hasta más de 104 °F)
- **Tos**
- **Moqueo**
- **Ojos rojos y/o llorosos**
- **Sarpullido** (aparece de 3 a 5 días después del inicio de los síntomas)

El sarampión puede ser grave.

El sarampión puede causar complicaciones graves de salud, como neumonía, inflamación del cerebro (encefalitis) e incluso la muerte.

1 de cada 5 personas que contraen sarampión será hospitalizada.

1 de cada 20 niños con sarampión contraerá neumonía, la causa más frecuente de muerte por sarampión en niños pequeños.

1 de cada 1000 personas con sarampión presentará inflamación del cerebro por la infección (encefalitis), lo cual puede causar daño cerebral.

De 1 a 3 de cada 1000 personas con sarampión morirán.

Complicaciones a largo plazo

Una enfermedad muy rara, pero mortal, llamada panencefalitis esclerosante subaguda, puede desarrollarse de 7 a 10 años después de que una persona se haya recuperado del sarampión.

Usted tiene el poder de proteger a su hijo.

Dele a su hijo una protección segura y duradera contra el sarampión al asegurarse de que reciba la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en español). Consulte con su profesional de la salud.

CDC www.cdc.gov/measles