


Tumia myeyuko wa klorini wa 0.05% (500ppm) ili kuua viini katika sehemu za safu ngumu, vitambaa na nguo, barakoa na glavu zinazoweza kutumika tena, na sahani na vyombo vinavyotumiwa na mtu aliye na mpox au wakati wa kumhudumia mtu aliye na mpox. **Tengeneza myeyuko mpya wa 0.05% ya klorini kila siku.** Tupa kwa uangalifu myeyuko wowote uliobaki kutoka siku iliyotangulia kwenye mfumo wa maji taka au maji taka.




1
Hakikisha umevaa **glavu, barakoa, na nguo zinazofunika ngozi.**

Kumbuka: Aproni na kinga ya macho vinaveza kutumika, ikiwa vinapatikana, ili kulinda dhidi ya hatari ya kurukiwa.



Koroga vizuri kwa sekunde 10, au mpaka poda/ chembe za klorini ziwe zimeyeyuka.



Mimina 200mL kioevu cha kupausha kwenye ndoo ya lita 20, kisha na maji hadi kwenye alama ya 20L.

Kumbuka: ikiwa unatumia mkoleo mwengine usio 5% ya kioevu cha kupausha, rekebisha wingi wake ipasavyo.

Ongeza vijiko VIWILI nya kulia chakula (30g) nya poda ya klorini (35%) hadi kufikia lita 20 za maji kwenye ndoo.

*pia inajulikana kama poda ya kupausha au chokaa yenye klorini



Weka lebo kwenye ndoo "**Myeyuko wa 0.05% ya Klorini-Inua Viini**" na uongeze tarehe ya mwisho wa matumizi.

Funika ndoo na kifuniko na chovya kitambaa safi pekee au kikombe ndani ya myeyuko wakati wa matumizi (yan), usitumbukize mara mbili vitambaa vilivyochafuli ili kuepuka kuuchafua myeyuko).

Usihifadhi kwenye jua moja kwa moja.



Nyenzo Zizonahitajika



ONYO



USICHANGANYE klorini klorini pamoja na bidhaa za kusafisha.

USIWEKE myeyuko wa myeyuko mwengine ndani ya mdomo au macho.