

**Proteja a su bebé**

# Hágase la prueba de sífilis



La sífilis es una infección que las madres pueden transmitir a sus bebés durante el embarazo. **Esta puede hacer que los bebés se enfermen gravemente, causarles problemas de salud continuos y, en algunos casos, puede provocarles la muerte.**

La sífilis se puede curar con el medicamento adecuado.

Si la madre no recibe tratamiento, **puede transmitir la sífilis a su bebé.**

Esto se llama sífilis congénita.

Es mejor hacerse la prueba **de sífilis 3 veces** durante el embarazo.



# Hágase la prueba en cuanto pueda

## Es posible que usted no sepa que tiene sífilis.

Cualquier persona que tenga relaciones sexuales puede contraer sífilis. Muchas personas con sífilis no presentan ningún síntoma. La única forma de saberlo es haciéndose la prueba de detección.



## Debe hacerse la prueba **3 veces** durante el embarazo:



**En la primera visita al consultorio médico o tan pronto sea posible durante el embarazo.**

- Aunque usted se haya hecho la prueba de detección de sífilis en el pasado, se la debe hacer cuando quede embarazada.
- Si tiene sífilis, su pareja sexual también necesita hacerse la prueba y recibir tratamiento o usted podría volver a contraerla.



**Durante el tercer trimestre (o 3 meses antes de la fecha de parto).**

- Es posible contraer sífilis más adelante en el embarazo o volver a contraerla, así que debe hacerse la prueba por segunda vez alrededor de las 28 semanas de embarazo.



**En el hospital cuando tenga al bebé.**

- Es posible contraer sífilis más adelante en el embarazo o volver a contraerla, así que es muy importante hacerse la prueba en el parto.



# El tratamiento rápido puede proteger a su bebé

## Si usted tiene sífilis, necesita recibir tratamiento de inmediato.

Para asegurarse de que su bebé no contraiga sífilis, es importante que usted reciba medicamento **tan pronto sea posible**.

Si falta a alguna cita, puede que el medicamento no funcione con la misma eficacia.

.....  
Algunas veces, el medicamento se puede dar una vez, justo cuando averigua que tiene sífilis.

.....  
Algunas veces, puede que tenga que ir a otro médico **para obtener el medicamento** o regresar para recibir dosis adicionales.



Notifique a su médico o enfermera si por cualquier motivo no puede obtener el medicamento. **Ellos se encargarán de obtener el medicamento que usted necesita para mantenerse sana y proteger a su bebé.**

La consecuencia de no recibir tratamiento para la sífilis congénita es demasiado alta.



### Sin medicamentos, la sífilis congénita puede causar:

➔ Que el bebé nazca antes de lo debido o muy pequeño

➔ Que el bebé tenga problemas de salud de por vida

➔ Aborto espontáneo, muerte fetal o muerte del recién nacido

**Si está embarazada, hágase la prueba de sífilis lo antes posible.**



.....  
Visite <https://gettested.cdc.gov/es>  
o comuníquese con el  
departamento de salud local:

**La salud de su bebé  
depende de la suya.**

**Hágase la prueba  
de sífilis hoy.**

