

# ノミ媒介発疹チフス | 知っておくべきこと

ノミ媒介発疹チフスは、感染したノミまたはそのウンコ（ノミの糞）に存在する細菌によって引き起こされます。



知らないうちにノミやノミの糞に触れることもあります。



ペットがノミを家の中や周辺に持ち込むこともあります。

家庭ゴミや生ゴミが、ネズミやその他の有害な小動物を家に呼び寄せることもあります。

ノミは、家の近くの野良動物や野生動物（猫、ネズミ、オポッサムなど）に寄生していることがあります。

ノミとの接触を防ぐ：



ペットのノミを駆除する。

屋外では、EPA登録の虫よけを使用する。

げっ歯類を家に寄せ付けない。  
穴を塞ぐ！  
ネズミをわなに掛ける！  
ゴミを片付ける！

ノミや野良動物、野生動物と接触した後、発熱、体の痛み、悪心、嘔吐、発疹が発生した場合は、医療従事者に診てもらってください。



発熱

筋肉痛

悪心、嘔吐、  
または腹痛

発疹



ノミ媒介発疹チフスは治療可能ですので、すぐに医療従事者に診てもらってください！

詳細情報：



U.S. Department of Health and Human Services  
Centers for Disease Control and Prevention